

신개념 대장내시경 전처리 하제

이노프리솔루션 액

INNO FREE SOLUTION

3's Innovation

복용량의 혁신 !
맛의 혁신 !
세장력의 혁신 !

2010년 FDA 승인 (Oral Sulfate Solution : OSS 제제)

177ml x 2병



(주)MH헬스케어

신개념 대장내시경 전처리 하제

이노프리솔루션 액

INNO FREE SOLUTION

1st
INNO

기존의 장 세장제 보다 훨씬 적은 양으로
복용량을 혁신적으로 줄였습니다.



복용량 1L
473ml x 2병

2st
INNO

기존의 장 세장제보다 훨씬 적은 양으로 더 우수
한 장 세정 효과를 보였습니다



- 1) PEG+Ascorbic acid제제 (PEG-EA)보다 장
세정 효과가 더 우수
- 2) Sulfate free Electrolyte제제 (SF-ELS)보다
장 세정 효과가 더 우수

3st
INNO

국내 최초로 장 세정제에 Talin 이라는 천
연 감미제를 사용하였습니다



기존의 장 세장제를 복용하시기 꺼려하셨
던 환자분들도 거부감 없이 복용하실수 있
습니다

믹스베리향 첨가로 복약 순응도가 향상되었습니다.

■ 우수한 세장력

Sodium Picosulfate + Magnesium citrate(SP+MC)제제보다 장 세정 효과가 훨씬 더 뛰어남.

TABLE 3. Preparation cleansing scores for OSS versus SP+MC

Score	OSS, no. (%)	SP+MC no. (%)	P value*
4, excellent	92 (54.4)	44 (26.2)	< .001
3, good	68 (40.2)	100 (59.5)	
2, fair	6 (3.6)	13 (7.7)	
1, poor	3 (1.8)	6 (3.6)	
Missing	0	5 (3.0)	

One patient was excluded as nonevaluable for efficacy analysis.
OSS, Oral sulfate solution; SP+MC, sodium picosulfate plus magnesium citrate.

*P value comparing excellent preparations is from a 1-tailed Fisher exact test.

Gastrointestinal Endoscopy Volume ■, No. ■ : 2014

PEG+Ascorbic acid제제 (PEG-EA) 및 PEG 4L제제(SF-ELS)보다 장 세정 효과가 더 우수




Table. Patient Demographics and Efficacy and Safety Data From Three Randomized Clinical Trials of Oral Sulfate Solution

■ 기존의 4L제제와 동일한 Safety Profile

TABLE 6. Treatment-emergent adverse events, intent-to-treat population

	Sulfate	SF-ELS	95% CI†	P value†
n	63	67		
No. of subjects with any event‡	6 (9.5)	8 (11.9)	(-13.0-8.2)	.780
No. of events	7	11		
GI events§	3 (4.8)	8 (11.9)	(-16.6-2.2)	.209
Abdominal bloating	0	2 (3.0)	(-7.1-1.1)	.497
Abdominal cramps	0	1 (1.5)	(-4.4-1.4)	1.000
Gagging	0	1 (1.5)	(-4.4-1.4)	1.000
GI hemorrhage	0	1 (1.5)	(-4.4-1.4)	1.000
Hematochezia	1 (0.6)	0	(-1.5-4.7)	.485
Nausea	1 (1.6)	6 (9.0)	(-14.9-0.1)	.116
Proctalgia	1 (1.6)	0	(-1.5-4.7)	.485
Laboratory investigations	2 (3.2)	0	(-1.2-7.5)	.233
Phosphate increased	2 (3.2)	0	(-1.2-7.5)	.233
Potassium increased	1 (1.6)	0	(-1.5-4.7)	.485
Nervous system (headache)	1 (1.6)	0	(-1.5-4.7)	.485

SF-ELS; sulfate-free electrolyte lavage solution.

* 95% CI for difference in proportion.

† P value from Fisher exact test.


‡ Subjects were counted once within each body system and preferred term.

§ Vomiting reported on the patient diary was included only if rated as severe.


이노프리솔루션 액

INNO FREE SOLUTION


복용방법




1
동봉된 용기에
이노프리 용액 한병을
벗습니다.



2
용기의 표시선 까지
차가운 물을 붓고 용액을
섞습니다.



3
혼합한 용액을 모두 마십니다.



4
1시간 이내에 물을 추가로 1L를 마십니다.
(용기의 표시선 까지 물을 붓고 2차례 마십니다.)

INNOFREE 솔루션은 2차례에 걸쳐 복용해야 하는 약제입니다. 177ml약액 2병을 모두 복용해야 정확한 검사가 가능합니다.

1차 복용: 검사 전날 저녁
_____ 시에 옆면과 같이 복용합니다.

2차 복용: 검사 당일 오전
_____ 시에 옆면과 같이 복용합니다.

참고: 대장내시경 검사 시작 2시간 전에 약액 및 추가 물 복용 모두 마치셔야 합니다.

주의: 옆면의 사용법과 같이 반드시 물과 희석하여 복용하십시오.

Drug information

전문약품 : 분류번호 721

원료약품 및 분량	<div>1병(177ml) 중</div> <div> <div>무수황산나트륨(USP)</div> <div>17.5 g</div> </div> <div> <div>황산칼륨(JP)</div> <div>3.13 g</div> </div> <div> <div>무수황산마그네슘(USP)</div> <div>1.6 g</div> </div> <div>* 첨가제(보존제) : 벤조산나트륨 0.088 g</div>
성상	갈색의 플라스틱 용기에 든 미스베리향의 무색투명한 액제
효능·효과	대장(X선, 내시경)검사 시의 전처치용 장세척 (변비치료 목적으로 사용하지 않도록 한다)
포장단위	177ml x 2병 / box



(주)MH헬스케어

157-841 서울시 강서구 공항대로 471
Tel. 02-2604-7002 Fax. 02-2606-7002

사내교육용